



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986 התרופה משוקת ללא מרשם רופא.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

**חומרים פעילים וריכוזם:** Povidone Iodine 5%

**חומרים בלתי פעילים** **ואלרגניים** **בתכשיר:** ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קודא בעית העלון עד סופו** **בתרם** **השתמש** **בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלך להשתמש בתרופה בצורה ככונה:

- היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
- עלך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מתמייים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

**1. למה מיועדת התרופה?**

תרופה זו מיועדת לטיפול בדלקת הרתיק.

קבוצה תרופיסית : חומרים אנטיספטיים (מתמאים).

**2. לפני שימוש בתרופה:**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אין להשתמש אם את רגישה (אלרגית) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוז.

אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובלת או סבלת **בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).**

אם הנך רגישה למוזן כלשהו או לתרופה כלשה, עלך להודיע על כך לרופא לפני סגילת התרופה.

**אהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אם הנך לוקחת, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובת בין התרופות.

• הריון והקמה: אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

• פולידין פתילות נועדו לשימוש בנרותיק בלבד. תוך ימים אחדים עשויים סימני המחלה להיעלם. למרות זאת יש להמשיך בטיפול ולהשלטו בהתאם להוראות.

• יש להמשיך את הטיפול עם התרופה הממורז החודשי אם החל בזמן הטיפול.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה.

**שימי לב: לא לבלוע!** התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

**מינון:** בטיפול ראשוני רצוי להיוועץ עם הרופא לגבי המינון. מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא – פתילה אחת ליום במשך 7 ימים.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

**אופן השימוש:** הסירי הטיפסה מן הפתילה, שתמשי באפליקטור (מוליך המיוחד, אולם אם הנך בהריון בררזי עם הרופא לפני השימוש באפליקטור. שכבי על גבך כשרגליך כלפי מעלה והחדירי את האפליקטור עמוק ככל היתן ללא הפעלת כוח ושחררי את התרופה ע"י דחיסת המנף. רחצי את האפליקטור במים חמים וסבון. לבשי רק לבגים מכונתה והחלפי לעיתים קרובות, גם רגבינים יש להחליף מדי יום.תתכן הדבקה של בן הזוג ולכן יש להקפיד על הימנעות ממגע מיני או על שימוש בקונדומים בעת מגע מיני במשך כל תקופת הטיפול. כמו כן רצוי להתייעץ עם הרופא בדבר הצורך בטיפול תרופתי גם בנב הזוג אם הנך משתמשת בתכשיר לטיפול הרתיק בין טיפול לטיפול, הקפידו לא להחדיר את נוזל השטיפה בעוצמה וכבומת רבה מדי , כדי לא להחדיר הנוזל לרוחם – דבר העלול להעביר את הדחיהם לשם. אם הנך בהריון אל תשתמשי כלל בתכשיר שטיפה בעת השימוש בתרופה לנרותיק תתכן הכתמה של הלבנים. כדי למנוע הכתמה ניתן להשתמש בתחבושת הייבנית או מגן תחתון.

**אין לטול תרופה בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוסלת את התרופה. הרכיבי משקפים את הנך וזקוקה להם.

**4. תופעות לוואי:**

כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין פתילות וגינוליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהשתמשות כגון: גירוי. אם זה מתמשך יש לפנות לרופא.

במקרים נדירים יש פריחה או נפיחות הפסיקו טיפול ופני לרופא.

• בכל מקרה שבו הנך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית יש להיוועץ עם הרופא מיד.

**5. איך לאחסן את התרופה?**

• **מנעי הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום גגור מחוץ להישג ידם של ילדים ואו תמיקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אם בסעות בלע ילד מן התרופה, פני מיד לחוד מיון של בית-חולים והביאי אריזת התרופה איתך. **אל תגרמי להקאה ללא**

הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתחיל ליום האחרון של אמוז חודש.

• אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

• יש לאחסן באריזה המקורית .

**6. מידע נוסף**

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Polyethylene Glycol

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? פתילות בצבע צהם כהה, 12 פתילות באריזה

בתוספת אפליקטור.

בעל הרישום: פיסר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, ת.ד. 39071, ת"א 61390.

• פסילרין כמותכתב-בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשיה משגב, ד.ב. משגב 20174.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 17.09.14

• מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 44.68.23414.

## בולידין®

### פתאל מהבילה

נشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986 –
يسبق هذا الدواء بدون وصفة الطبيب
تم تحديد صياغة هذه النشرة والمصادقة على محتواها من قبل وزارة الصحة.

**المادة الفعالة وتركيزها:** 5% Povidone Iodine
المواد غير الفعالة ومسببة للحساسية في المنتج: نظير البند 6.
\* معلومات إضافية \*
أقرأ النشرة بتدعمن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.
يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء.
إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

- عليك استعمال الدواء بالطريقة الصحيحة.
- استشر الصيدلي إذا ما كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
- يجب عليك مراجعة الطبيب إذا زادت أعراض المرض أو لم تتحسن الحالة الصحية بعد 7 أيام.

**1. ما هدف هذا الدواء؟**

هذا الدواء مُخصَّص لعلاج التهابات المهبل.

المجموعة الطبية: المواد المطهرة (المطهرات).

**2. قبل استخدام الدواء:**

**يُمنَع استخدام هذا الدواء في حالة:**

يُمنَع استخدام الدواء في حالة وجود حساسية لأحد مركباته أو لليود.

يمنَع استخدام المستحضر دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إن كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطراب في وظائف الغدة الدرقية.

إذا ما كانت لديك حساسية ما لإحدى المواد الغذائية أو لدواء مُعين، عليك إبلاغ الطبيب بهذا الأمر قبل استخدام الدواء.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:**

• في حالة تناولك أو إذا ما تناولت في الفترة الأخيرة. دوية أخرى بما في ذلك أدوية يُمكن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية.
قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذا الأمر.
وذلك لمنع المخاطر أو عدم فعالية الدواء التي قد تنتج جراء تفاعلات الأدوية.
الحمل والرضاعة:
إذا ما كنتِ حاملاً أو مرضعاً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

فتائل بوليدين معدة للاستخدام في المهبل فقط.
خلال أيام معدودة يمكن أن تبدأ علامات المرض بالزوال.
بالرغم من ذلك يجب الاستمرار بالعلاج واتصاهه بحسب التعليمات.

يجب متابعة العلاج حتى في فترة الدورة الشهرية إن صادفت في وقت العلاج.

**3. كيف يُستخدم هذا الدواء؟**

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء مُخصَّص للاستخدام الخارجي فقط.



الجرعة: في العلاج الأول يفضل استشارة الطبيب حول الجرعة. في حال عدم وجود تعليمات أخرى من

الطبيب فإن الجرعة المقبولة هي فتيلة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام.

**طريقة الاستخدام:**
أزيلي الغلاف عن الفتيلة، واستعملي قضيب الإدخال.
ولكن إن كنت حاملاً فاستوضحي الأمر مع الطبيب قبل الاستعمال.
استلقي على ظهرك ورجلاك مرفوعتان لأعلى وأدخلي القضيب عميقاً قدر الإمكان دون استعمال القوة وحريء الدواء عبر نفع الأنبوب الداخلي.

اغسلي القضيب بالماء الساخن والصابون.
اليسي ملابس داخلية قطنية وغيرها في فترات متقاربة.

الجوارب الطويلة يجب تغييرها كل يوم.
من الممكن أن تنتقل العدوى إلى الزوج لذلك يجب الامتناع عن الاتصال الجنسي أو يجب استعمال العازل عند الاتصال الجنسي طوال فترة العلاج.
من المفضل

أيضا استشارة الطبيب حول حاجة الزوج لعلاج طبي.
إذا كنت تستعملين مستحضراً طبياً لتنظيف المهبل بين علاج وآخر فاحرصي على أن لا يكون سائل الغسل بدياً وكيميائياً كبير من اللازم كي لا يدخل السائل إلى الرحم.
الأمر الذي يمكنه أن ينقل التلويث إلى هناك.
إذا كنت حاملاً فلا تستعملي سائل التنظيف بالمرّة.
في وقت استعمال الدواء للمهبل يمكن أن تتلطخ الملابس الداخلية.
كي تمنعي هذا التلطبخ استعملي قوطاً صحية أو واقي للملابس الداخلية.

**يُمنَع استخدام الدواء في الظلام.**
قوموا بفحص اللصق والجرعة **في كل مرة** تستخدمون الدواء.
قوموا بوضع النظارات إذا ما كنتم بحاجة لها.

**4. الأعراض الجانبية:**

• مثل أي دواء آخر، فإن استخدام بوليدين قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين.

• مثل الحكة.
إذا استمر ذلك توجهي للطبيب.

• في حالات نادرة وعند ظهور الطفح الجلدي أو الانتفاخ توقفي عن الاستخدام وتوجهي للطبيب.

• في حالة من الشعور بظهور أعراض جانبية لم تذكر في النشرة أو طرأ تغير في شعورك العام فطليكَ استشارة الطبيب فوراً.

**5. كيف تُخزّن الدواء؟**

• **تجنّب التسعّم!**
يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يد الأولاد و/أو الأطفال وهكذا يتم تجنب حدوث التسعّم.
إذا ما قام الولد بإبتلاع هذا الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ الموجودة في أقرب مستشفى وبحوزتك عبوة الدواء.
لا

**تتسبب بالتقيح المتعمد** بدون تصريح واضح من قبل الطبيب.

• يُمنَع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على العبوة.
يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

• يُمنَع تخزينه في درجة حرارة تزيد عن 25°C.

• يجب تخزينه في عبوته الأصلية.

**6. معلومات إضافية**

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي المنتج على: Polyethylene Glycol

كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة؟
فتائل بلون بني غامق، 12 فتيلة في العبوة

بالإضافة لقضيب الإدخال.

• صاحب التسجيل: فيشر مختبرات أدوية (1975) م.ض.ص.ب. 39071. تل اببيب 61390.

• اسم المنتج وبنائه: بن شمعون فلوريش م.ض. المنطقة الصناعية مسغاف، بريد منقول مسغاف 20174.

• تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: 17.9.2014.

• رقم تسجيل هذا الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 44.36.23414.

## ד״ר פישר – זה הַדּוֹק





**MEDICAL  
POLYDINE®  
VAGINAL PESSARIES**

Patient package insert in accordance with the Pharmacists' Regulations (Preparations) 1986.

No doctor's prescription is needed for this medicine. The format of this bulletin was determined by the Ministry of Health who has reviewed and approved its content.

**Active Ingredients: Povidone Iodine 5%.  
Inactive Ingredients and Allergens in this medicine:**  
See paragraph 6 "additional information".

**Read this leaflet carefully in its entirety before using this medicine.** This leaflet contains essential information about the medicine. If you have additional questions, consult your doctor or a pharmacist. You must use this medicine in a proper manner.

- Consult your pharmacist if you need additional information.
- Inform your doctor if the disease's symptoms worsen or will not get better after 7 days use.

**1. Therapeutic Activity:**

Antiseptic preparation for infected vaginitis.  
Therapeutic Group: Antiseptic substances (disinfectants).

**2. Before using the medicine:**

**Do not use the medicine if:**  
you are sensitive (allergic) to one of the ingredients of the medicine or to Iodine. If you suffered from a malfunction of the Thyroid gland, do not use the medicine before consulting a doctor.

If you are sensitive to a particular food or medicine, you should report this fact to your doctor before commencing treatment with this medicine.

**Special warnings concerning the use of the medicine:**

- If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, including non prescription medicines or food supplements, inform the doctor or the pharmacist in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.
- Pregnancy and breastfeeding: If you are pregnant or breastfeeding, consult a doctor or a pharmacist before you begin using the medicine.
- Polydine Pessaries are prescribed for vaginal use only. Even if symptoms of your condition improve within a few days, treatment must be continued until completed according to the instructions.
- Treatment must be continued during monthly menstruation if it occurs while taking this medicine.

**3. How to use the medicine?**

Consult your doctor or pharmacist if you have any doubts.

**Attention: Do not swallow!** This medicine is intended for external use only.

**Dosage:** When first commencing treatment it is advisable to consult your doctor regarding the desired dosage. The accepted dosage in the absence of a doctor's instructions is one pessary daily for a period of 7 days. Consult a doctor if your condition is not improved within 7 days.

**Directions for use:** Remove the pessary from foil pack and place in the supplied applicator. If you are pregnant, the use of the applicator must be clarified with your doctor before hand. While lying on your back, with your knees bent and hips slightly raised, insert the applicator as deep as possible into the vagina without the use of force and release the pessary use of the applicator plunger. After use wash the applicator with soap and hot water. During treatment wear only cotton underwear and change frequently. Stockings should also be changed daily. As there exist the possibility of your partner being infected, sexual relations should be avoided or the use of a condom be employed in sexual relations during the entire period of treatment. It is also desirable to consult your doctor regarding the necessity of medical treatment for your partner. If you are using a preparation (douches) for rinsing the vagina between treatments, take care not to use too much liquid or force when douching in order to avoid the liquid penetrating the womb and spreading the infection. If you are pregnant, do not use a douche for rinsing the vagina. During the treatment your underwear may become stained, in which case the use of sanitary towel or panty liner should be considered.

**Do not take this medicine in the dark!** Check the label and dose **each time** you use your medicine. Wear glasses if you need them.

**4. Side Effects:**

- Like in other drugs, using Polydine Vaginal Pessaries may cause some side effects such as: irritation. Consult your doctor if this persists.
- Discontinue use and consult your doctor immediately in rare cases of local rash or inflammation.
- Any time you experience side effects that are not listed in this leaflet or if you feel any change in your general health, consult your doctor immediately.

**5. How to store the medicine?**

**Avoid Poisoning!** This medicine like all other medicines, must be stored in a safe place and out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

**Do not induce vomiting** unless explicitly instructed to do so by a doctor!

- Do not use the medicine after the expiry date printed on the package. The expiry date is always the last day of that month.
- Do not store over 25°C.
- Always keep in the original package.

**6. Additional information**

- In addition to the active ingredient, the medicine also contains: Polyethylene Glycol
- How does the medicine look like and what are the contents of the package? 12 dark brown pessaries plus an applicator.
- The registration owner: Fischer Pharmaceutical Labs. (1975) Ltd. P.O.B. 39071, Tel-Aviv 61390.
- Manufacturer: Ben-Shimon Floris Ltd., Misgav Industrial Park, Misgav 20174.
- This bulletin was reviewed and approved by the Ministry of Health on: 17.9.2014.
- The medicine's license number in the state medicine registry at the Ministry of Health is 44.68.23414

**Полидин®  
Вагинальные суппозитории**

Инструкция для потребителя в соответствии с Положениями о фармацевтике (о препаратах) от 1986 г.  
Лекарство продается без рецепта.

Формат данного листа-вкладыша утвержден Министерством здравоохранения, а его содержание было проверено и одобрено данным Министерством.

**Активные вещества и их концентрация:** Povidone Iodine 5%  
**Неактивные вещества и аллергены в составе препарата:** см. параграф 6 «Дополнительная информация».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед использованием лекарства.** Данная инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

- Необходимо использовать данное лекарство правильным образом:
- Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам требуется дополнительная информация.
- Вы должны обратиться к врачу в случае, если симптомы заболевания усугубляются, либо не наступает улучшение по прошествии 7 дней.

**1. Для чего предназначено это лекарство?**

Данное лекарство предназначено для лечения вагинального воспаления. Фармако-терапевтическая группа: антисептические вещества (дезинфицирующие средства).

**2. Перед использованием лекарства:**

**Нельзя использовать данное лекарство в следующих случаях:**

Не используйте данное лекарство, если известно о вашей чувствительности (аллергии) к одному из компонентов данного лекарства или к йоду.  
Не используйте данное лекарство, не проконсультировавшись предварительно с врачом, а также если вы страдаете или страдали в прошлом от нарушения функций щитовидной железы.

Если вы чувствительны к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату, сообщите об этом врачу перед началом использования лекарства.

**Особые предостережения относительно использования данного лекарства:**

- Если вы принимаете в настоящее время или принимали недавно другие лекарства, включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность, являющиеся следствием межлекарственных взаимодействий.
- Беременность и кормление грудью: если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием этого лекарства.
- Суппозитории «Полидин» предназначены только для вагинального использования. В течение нескольких дней симптомы болезни должны исчезнуть. Несмотря на это, курс лечения следует продолжить и завершить его в соответствии с инструкциями.
- Лечение необходимо продолжать также и во время менструации, если она наступила во время курса лечения.

**3. Как использовать это лекарство?**

Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам, вызывающим у вас сомнения.  
**Обратите внимание: не глотать!** Лекарство предназначено только для внешнего использования.

**Дозировка:** Начинать лечение впервые, желательно проконсультироваться с врачом по поводу дозировки. Рекомендуемая дозировка при отсутствии иного предписания врача – один суппозиторий в день, в течение 7 дней.

Если ваше состояние не улучшится в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.  
**Способ применения:** удалите с суппозитория защитную оболочку, для введения используйте специальный аппликатор, но, если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом до начала использования по поводу использования аппликатора. Лягте на спину, поднимите ноги вверх и введите аппликатор во влагалище как можно глубже, не применяя при этом силу. Затем высвободите лекарство, нажав на рычаг. Вымойте аппликатор теплой водой с мылом. Носите только хлопчатобумажные трусы и чаще их меняйте. Колготки также необходимо менять каждый день. Возможно заражение половым путем, поэтому следует воздержаться от половых контактов либо пользоваться презервативами в течение всего периода лечения. Кроме того, желательно проконсультироваться с врачом относительно необходимости медикаментозного лечения также и для вашего полового партнера. Если вы пользуетесь раствором для спринцевания в перерывах между процедурами, не впрыскивайте жидкость для промывания под слишком сильным напором, чтобы раствор не попал в матку, поскольку это может быть чревато переломом в матку инфекции. Если вы беременны, не используйте вовсе раствор для спринцевания. В период вагинального применения суппозитория, возможно появление пятен на нижнем белье. Чтобы избежать появления пятен на белье, можно пользоваться гигиеническими прокладками.  
**Не используйте лекарство в темноте!** Проверьте этикетку и дозировку **каждый раз** в момент применения лекарства. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

**4. Побочные явления:**

- Как и при использовании любого другого лекарственного препарата, использование вагинальных суппозиториях «Полидин» у некоторых женщин может вызвать побочные эффекты, например, раздражение. Если раздражение долго не проходит, следует обратиться к врачу.
- В редких случаях возникновения сыпи или отеков следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
- В любом случае возникновения побочных явлений, не упомянутых в данном листке-вкладыше, либо, если возникнет изменение в общем самочувствии, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

**5. Как хранить данное лекарство?**

- **Предотвратите риск отравлений!** Данное лекарство, как и любой другой лекарственный препарат, необходимо хранить в недоступном для детей / младенцев месте, что позволит избежать их отравления. Если ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку с лекарством. **Не вызывайте рвоту,** не получив на то однозначного указания от врача.
- Нельзя использовать лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последней дате указанного месяца.
- Нельзя хранить лекарство при температуре выше 25°C.
- Следует хранить лекарство в его оригинальной упаковке.

**6. Дополнительная информация**

- Помимо активного вещества, данное лекарство содержит также Polyethylene Glycol.
- Как выглядит лекарственное средство, и что входит в содержимое упаковки? Суппозитории темно-коричневого цвета, 12 суппозиториях с аппликатором в упаковке.
- Обладатель лицензии: фармацевтические лаборатории «Фischer (1975) LTD», П.Я. 39071, Тель Авив, 61390.
- Название фирмы-изготовителя и её адрес: «Бен Шимон Флорис LTD», промышленный парк Мисгав, передвижная почта Мисгав, 20174.
- Данный листок-вкладыш был проверен и одобрен Министерством здравоохранения 17.09.14.
- Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 44.68.23414

**ד"ר פישר – זה קָדוֹק**

